

DAN-WAR-D LOMMEKORT

På de næste to sider findes lommekort med inklusions- og eksklusionskriterier til fordeling på relevante inkluderende afdelinger.

Sådan gør du:

1. Print de to sider (udskrift på begge sider af papiret)
2. Laminér siderne
3. Klip kortene ud

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Inklusionskriterier

Alder >18 år
Kronisk dialysebehandling
Nyopdaget eller prævalent atrieflimren

Eksklusionskriterier

CHA₂DS₂-VASc score ≤1
Anden indikation for antikoagulantia
Behandling med >1 blodpladehæmmer
Malign sygdom <1 år
Mavesår eller esofagusvaricer
Kendt blødningsforstyrrelse
Planlagt lumbalpunktur
Cerebrovaskulære el. arterielle kar-anomalier
Sår (Wagner grad>1)
Bakteriel endokarditis <3 måneder
Pågående blødning / hjerneblødning <4 uger
Ikke-elektiv / ikke ambulante kirurgi <7 dage
Svær trombocytopeni
Leversvigt med INR >1.5
Allergi for warfarin
Brug af hypericum perforatum
Graviditet eller amning
Ukontrolleret blodtryksforhøjelse
Ukontrolleret stofskiftesygdom
Pågående deltagelse i andre interventionsstudier

www.danward.dk

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Inklusionskriterier

Alder >18 år
Kronisk dialysebehandling
Nyopdaget eller prævalent atrieflimren

Eksklusionskriterier

CHA₂DS₂-VASc score ≤1
Anden indikation for antikoagulantia
Behandling med >1 blodpladehæmmer
Malign sygdom <1 år
Mavesår eller esofagusvaricer
Kendt blødningsforstyrrelse
Planlagt lumbalpunktur
Cerebrovaskulære el. arterielle kar-anomalier
Sår (Wagner grad>1)
Bakteriel endokarditis <3 måneder
Pågående blødning / hjerneblødning <4 uger
Ikke-elektiv / ikke ambulante kirurgi <7 dage
Svær trombocytopeni
Leversvigt med INR >1.5
Allergi for warfarin
Brug af hypericum perforatum
Graviditet eller amning
Ukontrolleret blodtryksforhøjelse
Ukontrolleret stofskiftesygdom
Pågående deltagelse i andre interventionsstudier

www.danward.dk

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Inklusionskriterier

Alder >18 år
Kronisk dialysebehandling
Nyopdaget eller prævalent atrieflimren

Eksklusionskriterier

CHA₂DS₂-VASc score ≤1
Anden indikation for antikoagulantia
Behandling med >1 blodpladehæmmer
Malign sygdom <1 år
Mavesår eller esofagusvaricer
Kendt blødningsforstyrrelse
Planlagt lumbalpunktur
Cerebrovaskulære el. arterielle kar-anomalier
Sår (Wagner grad>1)
Bakteriel endokarditis <3 måneder
Pågående blødning / hjerneblødning <4 uger
Ikke-elektiv / ikke ambulante kirurgi <7 dage
Svær trombocytopeni
Leversvigt med INR >1.5
Allergi for warfarin
Brug af hypericum perforatum
Graviditet eller amning
Ukontrolleret blodtryksforhøjelse
Ukontrolleret stofskiftesygdom
Pågående deltagelse i andre interventionsstudier

www.danward.dk

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Inklusionskriterier

Alder >18 år
Kronisk dialysebehandling
Nyopdaget eller prævalent atrieflimren

Eksklusionskriterier

CHA₂DS₂-VASc score ≤1
Anden indikation for antikoagulantia
Behandling med >1 blodpladehæmmer
Malign sygdom <1 år
Mavesår eller esofagusvaricer
Kendt blødningsforstyrrelse
Planlagt lumbalpunktur
Cerebrovaskulære el. arterielle kar-anomalier
Sår (Wagner grad>1)
Bakteriel endokarditis <3 måneder
Pågående blødning / hjerneblødning <4 uger
Ikke-elektiv / ikke ambulante kirurgi <7 dage
Svær trombocytopeni
Leversvigt med INR >1.5
Allergi for warfarin
Brug af hypericum perforatum
Graviditet eller amning
Ukontrolleret blodtryksforhøjelse
Ukontrolleret stofskiftesygdom
Pågående deltagelse i andre interventionsstudier

www.danward.dk

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Et nationalt multicenter randomiseret open-label, parallel-group klinisk studie af betydningen af forebyggende behandling med warfarin på risikoen for stroke og blødning hos patienter med kronisk nyresvigt i dialyse og atrieflimren.

Koordinerende investigator:

Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet
Mail: nicholas.carlson.01@regionh.dk
Tel: +45 35455927

www.danward.dk

10-03-23

Version 3.0

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Et nationalt multicenter randomiseret open-label, parallel-group klinisk studie af betydningen af forebyggende behandling med warfarin på risikoen for stroke og blødning hos patienter med kronisk nyresvigt i dialyse og atrieflimren.

Koordinerende investigator:

Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet
Mail: nicholas.carlson.01@regionh.dk
Tel: +45 35455927

www.danward.dk

10-03-23

Version 3.0

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Et nationalt multicenter randomiseret open-label, parallel-group klinisk studie af betydningen af forebyggende behandling med warfarin på risikoen for stroke og blødning hos patienter med kronisk nyresvigt i dialyse og atrieflimren.

Koordinerende investigator:

Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet
Mail: nicholas.carlson.01@regionh.dk
Tel: +45 35455927

www.danward.dk

10-03-23

Version 3.0

DAN-WAR-D

The Danish Warfarin-Dialysis Study

Et nationalt multicenter randomiseret open-label, parallel-group klinisk studie af betydningen af forebyggende behandling med warfarin på risikoen for stroke og blødning hos patienter med kronisk nyresvigt i dialyse og atrieflimren.

Koordinerende investigator:

Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet
Mail: nicholas.carlson.01@regionh.dk
Tel: +45 35455927

www.danward.dk

10-03-23

Version 3.0